nlimituuluutiinluutuuluutuul And or he was and Miel de Lakhegy 0Mtp723 Vass8R06s116-120 FIRA Collection Vassal-Montpellier Miel de Lakhegy 8 Rbs-116-120





oluntuuluutuuluutuuluutuul



ntinatumlantiidaatuulantuud

NOM Hiel de dahhegy EMPLACEMENT. 8 16 s 116. 120

ouche	Wbre yeux	rrement mi/déb	Ferti- lită	Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 fr 3 fr 3 fr 5		16.3 - 13.3 - 3,95(-4)	Pour : Bale :	TC - Cdisc-sp r : B-Cdisc-sp r : s	Mil. 5 - M - bh-ell- 6r-Rs-l m - ap	1 : - P I -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: Dov-cyl	l-fus inc - erb	- col	: L - ::- C

MOM Miel de Lakhegy IMPLACEMENT 8 R6 1 M6. 120

whe	Nbre yeux		rremont mi/d0b		Ferti- lité	*****************	raison mi/E		võ début	raison mi/v	- Ein	Maturit é
1 2 3 d 5	f 22 2	h13 h13	11.3 · 11.3 · 36(-5)	16	Couleur Pépins Fort:	TG - : dlsc-s g : R-G : s -	M - P Mil. - M - Sph-ell - Rs-P m - ar	Dim L: - P Di l-ov-c Rg-N - fc	im : obov-cy Jus	Compacture income	citó:	1, - i1 -C

Miel de bakhegy 8 R6 s. 116-120.0-4 N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

iliantanlaataalaataalaataal

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 / sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196/- entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

limborhanti

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2/12 / autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 24 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 25 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282/sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 2/20)- séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233./

A pétiole glabre 284 séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiel / ement.

- Calvo 94

N° d'ordre : Désignation : Miel de Lakhegy 8 R6 s - 116 · 120 & · 4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

ilantan hantan lantan lantan l

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 34

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1998

-

Observateur : Lacombe

Code cépage

Nom cépage: Miel de la bhegy

Emplacement: 8 R6 sl16-120

dontoolaatialaatiinliintiid

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 moyenne 3 - grande 7 - très grande 9 oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale(3)- orbiculaire(4 - réniforme 5 oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) - cinq3) - sept 4 - plus de sept 5

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 🕏 oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1)- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe nulle point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9 oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente (1)- présente 9 oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2)- involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible(1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faiblé 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9

Pétiole

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente ()

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible (1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible (1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176)

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1998

Observateur: Lacon be

Code cépage

Code clone:

Nom cépage: Miel de Lakhegy

Emplacement: 8 RGAMG. 120

dimtanlantiadastanlantad

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3)- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 🗇

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2)

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3)

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2)- elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1) - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3) - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic: peu apparent 1)- apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne(5)- élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune P - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236* saveur : aucune (1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3) - moyen (8-12mm)(5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3)

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1/- présentes 2.

Miel de Eakhegy 8 R6 s. 116, 120 s. 4

dinatunlmatualaatuulmatuul

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

luntantunt

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : M.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - a raies (2) - a bandes (3)/- ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (1) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) . : saillant (1) - effacé(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 94